

Schling- und Kletterpflanzen

Actinidia arguta

- gelber Strahlengriffel -

sommergrüner, üppig wachsender Schlinger, winterhart, Blätter schmal, 5 bis 7 cm groß, Blüte weiß, im Juni, Früchte stachelbeergroß, eßbar, zweihäusig, männlich und weiblich.

P / C 60-100 18,00

Actinidia chinensis

- Kiwi - (männlich und weiblich)

starkwüchsig, sommergrün, bedingt winterhart, große, weiche, herzförmige Blätter, Früchte braungrün, eßbar, zweihäusig, warmer, windgeschützter Standort erforderlich.

P / C 60-100 18,00

Actinidia chinensis 'Jenny'

- Kiwi -

selbstfruchtend, eßbar, sonst wie die Art, Winterschutz.

P / C 60-100 18,00

Actinidia kolomikta

- rosa Strahlengriffel -

sommergrüne, schwachwachsende Form, interessant durch die auffallend weiß bis weißrosa Blattzeichnung, nicht fruchtend, winterhart.

P / C 60-100 18,00

Akebia quinata

- Akebie -

halbimmergrüner, zierlich wirkender Schlinger, mit kleinen violetten bis purpuren Blüten im April bis Mai, für sonnige bis halbschattige Standorte.

P 60-100 15,75

Aristolochia macrophylla

- Pfeifenwinde -

sommergrüner, starkwüchsiger Kletterer für sonnige bis halbschattige windgeschützte Lagen, auffällige, sehr große eiförmige, dachziegelartig angeordnete Blätter.

P 40-60 18,00

P 60-80 23,00

Sol C 100-150 62,00

Campsis radicans

- Trompetenblume -

sommergrünes, mit Haftwurzeln kletterndes Gehölz, auffallende orangerote Trichterblüten (erst an älteren Pflanzen), für warme, geschützte, vollsonnige Standorte, Klettergerüst vorteilhaft.

C 60-100 8,00

Campsis radicans 'Flava'

- Trompetenblume -

Blüten gelb bis hellgelb, schon an jungen Pflanzen, Schnitt im Frühjahr wichtig, da die Blüten immer am Ende des neuen Triebes erscheinen.

C 60-100 13,00

Campsis tagliabuana 'Mme. Galen'

-Trompetenblume -

Blüten außen orange, innen scharlachrot, auch bereits an jungen Pflanzen.

C 60-100 13,00

Celastrus orbiculatus

- Baumwürger -

sommergrüner, robuster, starkwüchsiger Schlinger, für sonnige bis halbschattige Standorte, auffallend gelbe Herbstfärbung, gelbrote Früchte nach dem Laubfall, zweihäusig.

P / C 60-100 8,00

Clematis - Hybriden

sommergrüne, locker buschig wachsende Kletterpflanze für sonnige bis halbschattige Lagen, mit auffälligen 10 bis 20 cm großen Einzelblüten, Kletterhilfen erforderlich, Wurzelhals stets schattig und feucht halten.

- Solitärpflanzen auf Anfrage -

	P / 60-100
EUR / Stück	7,00

'Dr. Ruppel'

Blüte gestreift, lilarosa, Rand weißrosa, 15 bis 18 cm, von Mai bis Juni und August, starkwüchsig.

'Hagley Hybrid'

Blüte tiefrosa, dann heller, 10 bis 14 cm von Juli bis September, schwachwüchsig.

'Jackmanii'

Blüte dunkelviolettblau, 10 bis 13 cm, von Juli bis August, starkwüchsig.

'Madame Le Coultre'

Blüte reinweiß, 14 bis 17 cm, von Juni bis September, starkwüchsig.

'Mrs. N. Thompson'

Blüte gestreift, violettblau mit roten Streifen, 13 bis 15 cm, von Mai bis Juni und August, schwachwüchsig.

'Miss Bateman'

Blüte reinweiß, rote Staubgefäße, von Mai bis August, starkwüchsig.

'Multi Blue'

Blüten dunkelblau, gefüllt, 10 bis 20 cm große Einzelblüten, von Juni bis September.

'Nelly Moser'

Blüte gestreift, purpurrosa, hellrosa Rand, 15 bis 18 cm, von Mai bis Juni und August bis September, mäßig starker Wuchs.

'Niobe'

Blüte tiefrot bis purpur, 12 bis 14 cm, auffallend gelbe Staubgefäße, von Juni bis August, schwachwüchsig.

'Piilu'

Blüte gestreift, blaulila, gelbe Staubgefäße, schwachwüchsig.

'Rouge Cardinal'

Blüte purpur bis dunkelrot, 13 bis 16 cm, von Juni bis September.

'The President'

Blüte dunkelviolett, 14 bis 18 cm, Ende Mai, Juni bis Juli und Oktober, mäßig starkwüchsig.

'Ville de Lyon'

Blüte karminrot mit hellpurpurroten Streifen, 8 bis 14 cm, von Juli bis September, starkwüchsig.

'Warszawska Nike'

Blüte dunkelrot, mit gelben Staubgefäßen, Blüten 10 bis 15 cm groß, von Juni bis September.

Clematis - Wildarten

	P / 60-100
EUR / Stück	7,00

alpina

schwachwüchsige Wildform, Blüte klein und glockig, blauviolett im Mai, danach dekorative Fruchtstände.

montana 'Rubens'

starkwüchsige Kletterpflanze für Halbschatten und sonnige Lagen, geeignet zum Begrünen großer Flächen, Blüten hellrosa, später rosa, 6 bis 8 cm, von Mai bis Juni, Blattaustrieb purpur, später dunkelgrün.

montana 'Tetrarose'

wie vorherige Form, aber Blüten dunkelrosa und vom Wuchs etwas kräftiger, nach der Blüte reiche Fruchtstände.

tangutica

langsam kriechende oder kletternde Form, ca. 2 bis 3 m hoch, junge Zweige zottig behaart, Blüten goldgelb, 4 cm lang, anfangs glockig, später offen, im Juni bis September, dekorative Fruchtstände, für sonnige bis halbschattige Lagen.

vitalba

heimische Waldrebe, starkwüchsig bis 10 m hoch, für Sonne bis Halbschatten, bildet oft 'Schleppen' aus und benötigt daher ausreichend Platz, Blüte weiß, 2 cm breit, Juli bis August, leicht duftend.

viticella

zierliche und schwachwachsende Art für den Halbschatten, klettert oder kriecht, Hauptblüte im Juni, bis 5 cm breit, purpur bis violett.

Clematis viticella -Hybriden

'Betty Corning'

kleine Blüten, blau bis lila, mit gekräuseltem Rand, starkwüchsig, überreiche Blüte, von Juni bis September.

'Etoile Violette'

dunkellila Blüten mit gelben Staubgefäßen, 6 bis 10 cm große Einzelblüten, überreiche Blüte, von Juni bis September.

'Huldine'

Blüten silbrigweiß mit leichtem rosa Hauch, gelbe Staubgefäße, starkwüchsig, Blüte von Juni bis September.

'Mad. Julia Correvon'

Blüten rubinrot, bis 10 cm groß, mit gelben Staubgefäßen, mittelstarkwachsend, Blüte von Juni bis September.

'Polish Spirit'

dunkelviolette Blüten, Neueinführung aus Polen, mittelstarkwachsend, Blüte von Juni bis Oktober.

'Purpurea Plena Elegans'

dunkelrote gefüllte Blüten, in auffallender Form, mittelstarkwachsend, überreiche Blüte, von Juli bis September.

'Rubra' ('Kermesina')

magentarote Blüten, mit heller Mitte, starkwachsende Sorte dieser Gruppe, Blüte von Juni bis September.

Hedera helix

- gemeiner Efeu -

heimischer, immergrüner, selbstkletternder Schlinger, bis ca. 20 m und höher, glänzend dunkelgrünes grobgezähntes oder gelapptes Blatt, an älteren Blüentrieben (Altersform) wesentlich größer und ganzrandig, unscheinbare doldenförmige Blüten im Herbst, schwarze Früchte, sonnige bis sehr schattige Lagen, bedingt frosthart.

gestäbt

P	4-6 Triebe	40-60	4,60
P / C	4-6 Triebe	60-80	5,85
Sol C		80-100	18,00
Sol C		100-125	25,75
Sol C		125-150	36,50
Sol C		150-200	51,00

Hedera helix 'Goldheart'

wüchsiger, immergrüner Kletterefeu, Blatt gelappt, dunkelgrün, auffällige, leuchtend hellgelbe bis goldgelbe Zeichnung im Zentrum der Blattspreite, Ansprüche wie die Art, Standort etwas sonniger.

gestäbt

P		30-40	7,65
P / C		40-60	9,00
C		60-80	10,65
C		80-100	16,80

Hedera helix var. hibernica

- schottischer Efeu -

sehr wüchsiger, bedingt frostharter, immergrüner Kletterstrauch, Blätter deutlich größer als *Hedera helix*, stumpf dunkelgrün, mit sehr hellen Blattnerven, Ansprüche wie die Art.

gestäbt

P	4-6 Triebe	40-60	4,60
P / C	4-6 Triebe	60-80	5,85
Sol C		80-100	18,00
Sol C		100-125	25,75
Sol C		125-150	36,50
Sol C		150-200	51,00

Humulus lupulus

- Hopfen - P 60-100 8,00
 sommergrüne, starkwüchsige Schlingpflanze, Triebe hellgrün, rauh behaart, Blätter groß, dreilappig, dunkelgrün, Rückschnitt nach dem Laubfall dicht über dem Boden, zur Begrünung von großen Flächen und Rankgerüsten.

Hydrangea petiolaris

- Kletterhortensie - C 30-40 10,20
 dichtbuschiger, sommergrüner Kletterstrauch, selbstklimmend, Rankgerüst jedoch günstig, Blatt eiförmig, glänzend dunkelgrün, unterseits hellgrün, Jungtriebe hellgrün, später rotbraun, abblättern, überreiche weiße Doldenblüten im Juni bis Juli. C 40-60 14,00
 C 60-80 19,50
 Sol C 80-100 65,50
 Sol C 100-125 118,00
 Sol C 125-150 189,00

Jasminum nudiflorum

- Winterjasmin - P / C 40-60 7,60
 sommergrüner, lockerer Strauch mit in der Jugend aufrechten, später bogig überhängenden Grundtrieben, auffällige leuchtend gelbe Blüten von Dezember bis April am vorjährigen Holz, klettert nur mit Hilfe von Rankgerüsten, sonst bodenaufliegend. P / C 60-80 9,25
 Sol C 80-100 25,50
 Sol C 100-150 41,00

Lonicera - Geißblatt

Vielseitig verwendbare, anspruchslose Schlingpflanze mit meist überreich erscheinenden, oft stark duftenden Blüten, geeignet für sonnige bis schattige Lagen, zum Begrünen von Pergolen, Mauern und Bäumen, Rückschnitt nach der Blüte.

- Solitärpflanzen auf Anfrage -

	P / 60-100
EUR / Stück	6,55

'Dropmore Scarlet'

mittelstark wachsender, sommergrüner Schlinger, Blüte leuchtend orangerot von Juni bis Oktober, Früchte orange.

heckrottii

reichblühendes, schwachwindendes Geißblatt, Blüten rosarot, innen gelb, von Juni bis September, duftend.

henryi

starkwachsender, immergrüner Schlinger, mit dekorativen, frischgrünen lanzettlichen Blättern, Blüte unscheinbar, bronzefarben, von Juni bis August, Frucht schwarz.

periclymenum

heimisches Geißblatt, sommergrün, kräftiger Wuchs, Blüte von Juni bis August, gelblichweiß.

tellmanniana

sommergrüne, kräftige Form mit großen, leuchtend goldgelben Blüten, von Mai bis Juni, oft Nachblüte im Herbst, reichblühend, Früchte korallenrot.

Parthenocissus quinquefolia

- wilder Wein - Jungfernebe - P 60-100 6,15
 raschwachsender, sommergrüner Kletterer für sonnige bis halbschattige Lagen, Blatt fünfgefingert, glänzend dunkelgrün, gelbe bis karminrote Herbstfärbung, nicht selbstklimmend, braucht Rankhilfen. Sol C 100-150 27,50
 Sol C 150-200 39,00

Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii'

ähnlich der Art, Laub und Triebe jedoch feiner, selbstklimmend mit Hilfe von Haftscheiben, raschwüchsig. P 60-100 6,15
 Sol C 100-150 27,50
 Sol C 150-200 39,00

Parthenocissus tricuspidata 'Green Spring'

selbstklimmende, sommergrüne Form, Blatt dreidappig, im Austrieb grünlich, später hellgrün glänzend, etwas schwächer im Wuchs als 'Veitchii', intensive, orange bis scharlachrote Herbstfärbung.

P 60-100 9,00

Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii'

- wilder Wein - Jungfernrebe - selbstklimmender, raschwachsender Kletterstrauch, Blatt dreilappig, im Austrieb rötlich, dann glänzend grün, prachtvolle gelborange bis scharlachrote Herbstfärbung, zur flächigen Begrünung ganzer Wände und großer Pergolen.

P 60-100 7,55
Sol C 100-150 44,50
Sol C 150-200 62,00

Polygonum aubertii (Fallopia aubertii)

- Schlingknöterich - sommergrün, besonders starkwachsender, schnittverträglicher Schlinger mit überreicher weißer Blüte von Juli bis Oktober, geeignet für sonnige bis halbschattige Lagen, zur schnellen Begrünung großer Flächen.

P 60-100 5,40

Vitis coignetiae

sommergrüne, rostrote Rebe, sehr große, meist ungelappte Blätter, Blüte grünlich, Frucht purpur, sehr schöne scharlachrote bis karminfarbene Herbstfärbung, starkwachsend.

P / C 60-100 12,80

Wisteria - Blauregen - Glycine -

starkwachsender, sommergrüner Schlinger für sonnige bis halbschattige Lagen, besonders wüchsig in nahrhaften, humosen, nicht zu trockenen Standorten, durch regelmäßigen Rückschnitt wird die Blütenbildung gefördert, stabiles Rankgerüst erforderlich, nicht an Regenrinnen.

	60-100	100-150	150-200
EUR / Stück	24,50	44,50	62,00

floribunda

Blüte violett, Blütentrauben ca. 20 - 50 cm lang, von der Basis zur Spitze hin aufblühend, Mai bis Juni.

floribunda 'Alba'

bis 8 m hoch kletternd, Blüten 25 bis 30 cm lang, weiß, duftend.

floribunda 'Macrobotrys'

wie die Art, nur sehr lange Blütentrauben von 40 bis 70 cm Länge, violettblau.

floribunda 'Blau' (Typ Böhlje)

eigene Selektion mit schönen, hängenden, blauvioletten Blütentrauben von Mai bis Juni, vor dem Laubaustrieb erscheinend, oftmals Nachblüte im Sommer.

sinensis

sommergrüner, bekannter, blauviolett blühender Blauregen, Blüten erscheinen im April bis Mai mit dem Laubaustrieb in 15 bis 30 cm langen, hängenden Rispen, schwach duftend.

sinensis 'Alba'

wie vorherige Sorte, Blüte jedoch cremeweiß, duftend.